



MAGNATIL CALCICO®

magnesio / vitamina C / calcio

Comprimidos efervescentes

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración del medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

COMPOSICIÓN:

Cada comprimido efervescente contiene:

Acido Ascórbico.....	100 mg
Oxido de Magnesio (como óxido y sulfato).....	103,20 mg
Calcio.....	250,00 mg

Excipientes: ácido cítrico, bicarbonato de sodio, ácido adipico, sacarina sódica, Aspartame 20mg, saborizante limón, saborizante naranja, colorante amarillo FD&C N°6 (Amarillo crepúsculo), sorbitol.

PRESENTACIÓN:

Envases conteniendo 2 y 14 comprimidos efervescentes

INDICACIONES

Prevención y tratamiento de la hipomagnesemia asociada con hipovitaminosis C. Aporte de Calcio.

CLASIFICACIÓN:

Vitaminoterapia C con Calcio

ADVERTENCIAS:

No administrar a niños menores de 12 años sin indicación médica.

CONTRAINDICACIONES:

Insuficiencia renal grave. Insuficiencia hepática grave. Hipercalcemia. Antecedentes de cálculos renales a repetición. Úlcera gástrica e insuficiencia cardiaca. Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación.

INTERACCIONES:

Evitar la administración conjunta con tetraciclinas, porque disminuye la absorción del antibiótico.

La administración conjunta con sales cálcicas o productos a base de fosfatos inhiben la absorción intestinal del magnesio.

REACCIONES ADVERSAS:

Ocasionalmente transtornos gástricos leves, diarrea, rash.

PRECAUCIONES:

No tomar más de tres comprimidos al día, ni tomar la dosis máxima en un periodo de más de 2 semanas, salvo por indicación médica expresa.

Puede tener efecto laxante.

Debe controlarse la magnesemia, a fin de suspender el tratamiento oportunamente.


Si el paciente es una embarazada o una madre que amamanta, debe consultar al médico antes de tomar este medicamento.

"Este medicamento contiene como excipiente Aspartame. Las personas afectadas de fenilcetonuria tendrán en cuenta que cada comprimido efervescente contiene 20mg de fenilalanina"

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN

El médico deberá indicar la dosis y el tiempo de tratamiento adecuado a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

Un comprimido dos veces al día



Disolver el comprimido efervescente en medio vaso de agua o bebida refrescante. No repita el tratamiento sin indicación médica.

"Recurrir al Médico si los síntomas persisten o empeoran"

"Conservar a temperatura no mayor a 30°C"

Elaborado por: INSTITUTO BIOQUÍMICO BETA S.A.

Av. Las Americas No. 580, Santiago, Chile

Importado por: TECNOFARMA S.A.

Av. Velarde No 500

Santa Cruz – Bolivia

327133A



TECNOFARMA

