



# TIALGIN FORTE®

## PARACETAMOL / DICLOFENAC POTÁSICO

### 500 mg / 50 mg

#### Comprimidos recubiertos

Venta bajo receta médica

#### FÓRMULA:

Cada comprimido recubierto contiene:

Paracetamol.....500 mg  
Diclofenac Potásico.....50 mg  
Excipientes c.s.

#### ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Analgésico, antiinflamatorio.

#### PROPIEDADES:

Bloquea la generación del impulso doloroso mediante una acción periférica que puede implicar reducción de la actividad de las prostaglandinas y posiblemente inhibición de la síntesis o de las acciones de otras sustancias, las cuales sensibilizarían los receptores del dolor a los estímulos mecánicos o químicos. Además puede actuar periféricamente en el tejido inflamado, reduciendo la actividad de las prostaglandinas en estos tejidos y posiblemente inhibiendo la síntesis y/o acciones de otros mediadores locales de la respuesta inflamatoria.

Se absorbe por el tracto gastrointestinal distribuyéndose en la mayoría de los líquidos orgánicos y se une con las proteínas plasmáticas de forma rápida, obteniéndose niveles plasmáticos óptimos en aproximadamente 30 a 60 minutos.

El paracetamol se metaboliza principalmente por las enzimas microsomas hepáticas.

#### INDICACIONES:

Procesos inflamatorios postquirúrgicos, postraumáticos, odontalgias, osteoartritis, artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, dismenorrea, anexitis, ataques agudos de gota, cefalea, dolores leves a moderados en general y otros procesos inflamatorios no reumáticos.

#### POSOLÓGIA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

La dosis se ajustará al criterio médico y a las características del cuadro clínico.

Como dosis de orientación se aconseja a pacientes mayores de 12 años 1 comprimido cada 8 horas.

#### CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a los componentes del medicamento. No se debe utilizar en pacientes con úlcera péptica activa. Antecedentes de anafilaxia o angioedema inducida por AAS y otros AINES. Insuficiencia hepática y/o renal severa. Depresión de la médula ósea. Alcoholismo, enfermedad hepática o hepatitis viral.

#### EFFECTOS SECUNDARIOS:

En algunos pacientes se presenta ardor y dolor epigástrico,

Retención de fluidos, edema, mareo, valores elevados de transaminasas séricas.

#### PRECAUCIONES:

Se debe evaluar el riesgo/beneficio de su empleo en edema preexistente, hipertensión y diabetes mellitus, trastornos de la coagulación o de la función plaquetaria, evitar el consumo de bebidas alcohólicas. Su empleo por tiempo prolongado debe hacerse bajo prescripción médica.

#### INTERACCIONES:

Alcohol, enzimas hepatoinductoras, medicamentos hepatotóxicos, anticoagulantes, AINES, salicilatos.

#### PRESENTACIÓN:

Caja con 15 comprimidos recubiertos.

#### CONSERVACIÓN:

Almacenar a temperatura no mayor de 30° C y protegido de la luz y la humedad.

Elaborado en Argentina por:

MONTE VERDE S.A.

Ruta Nacional N° 40 e/calles 7 y 8.

Villa Aberastain, Prov. San Juan, Argentina.

Importado por TECNOFARMA S.A. Bolivia

Av. Velarde N° 500

Santa Cruz, Bolivia.

343333B



TECNOFARMA

