



EFFECTOS COLATERALES Y SECUNDARIOS:

En algunos pacientes puede presentarse náuseas, vómitos, diarrea o reacciones por hipersensibilidad.

CONTRAINDICACIONES:

Afecciones hepáticas o renales graves. Embarazo y lactancia. Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Se recomienda administrar con cautela en pacientes con antecedentes de síndrome convulsivo.

La fenilazopiridina pigmenta la orina de color anaranjado o rojizo.

CONSERVACIÓN:

Temperatura no mayor de 30°C

PRESENTACIÓN:

Envase conteniendo 16 comprimidos.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

**EN CASO DE SOBREDOSIS RECURRIR
AL HOSPITAL MÁS CERCANO
A SU DOMICILIO**



Elaborado en Paraguay por:
FARMACÉUTICA PARAGUAYA S.A.
W. R. Lovera y Del Carmen.
Fernando de la Mora, Paraguay.
D. T.: Q. F. Lourdes Bogarín - Reg. N° 4661
Importado por:
TECNOFARMA S.A. Bolivia
Av. Velarde N° 500, Santa Cruz, Bolivia.

131324/000



URIDON® F

**NORFLOXACINA 400 mg
CLORHIDRATO DE FENILAZOPIRIDINA 100 mg**

Comprimidos recubiertos

Vía Oral

Venta Bajo Receta Médica

FÓRMULA:

Cada comprimido recubierto contiene:

Norfloxacina 400 mg

Clorhidrato de fenilazopiridina 100 mg

Excipientes c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Antibiótico y analgésico urinario.

INDICACIONES:

Infecciones del tracto urinario como pielonefritis, pielitis, cistopielitis, cistitis, prostatitis, uretritis, profilaxis de sepsis en pacientes neutropénicos. Por la presencia de la fenilazopiridina en su composición, produce alivio en pocos minutos de los síntomas urinarios como disuria, ardor y tenesmo vesical.

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN:

En general se recomienda 1 comprimido dos veces al día (c/12 hrs.). El tratamiento debe prolongarse como mínimo 8 días.

En caso de cistitis aguda femenina no complicada, el tratamiento puede reducirse a tres días.

Infección crónica recurrente del aparato urinario: 1 comprimido dos veces al día. Si se logra controlar adecuadamente la infección en las cuatro primeras semanas de tratamiento, se puede reducir la dosificación a 1 comprimido al día. En la prostatitis crónica ha resultado muy eficaz el tratamiento durante 4 semanas.

Gonorrea (Uretritis, prostatitis o cervicitis gonocócica aguda): 2 comprimidos en una sola toma diaria durante 3 a 5 días.

